



13.4. Valoració inicial en el malalt amb HIPOTENSIÓ ARTERIAL. Algoritmes

La hipotensió és un signe de gravetat en el malalt crític, al veure's compromesa la perfusió d'òrgans fonamentals com cervell, medul·la espinal, cor o ronyons. Cal identificar amb celeritat la hipotensió en aquests malalts i iniciar mesures per revertir-la.



Algoritme d'actuació inicial en presència de criteris de gravetat




Tractament farmacològic segons Guia d'Actuació Infermera

Fluids (cristal·loides):

- Adults: 20-30 ml/kg SF 0,9%
- Nens: 20 ml / Kg SF 0,9%

Tractament farmacològic segons prescripció mèdica

Si el malalt no millora amb el tractament anterior i manté criteris de gravetat, valorar perfusió amb **Noradrenalina**: 0.05-0.5 µg/Kg/min iv., diluir 10 mg en 40 ml de SG 5%, iniciar a 2 ml/h. Valorar dosi segons resposta.



Intervencions comuns NICS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Suport emocional - Disminució de l'ansietat - Presència - Suport a la família - Facilitar la presència de la família - Assessorament - Escolta activa | <ul style="list-style-type: none"> - Prevenció de caigudes - Maneig ambiental: seguretat - Vigilància - Derivació - Transport entre instal·lacions - Documentació. - Intercanvi d'informació de cures de salut (transferència) |
|---|---|

13.5. Taxonomies

Rol autònom: NANDA - NOC - NIC

Rol col·laborador: Risc de complicacions (RC) - NOC - NIC

ROL AUTÒNOM			
NANDA		NIC	
00146	Ansietat	4920	Escolta activa
00005	Risc desequilibri T° corporal	5820	Disminució de l'ansietat
NOC		3900	Regulació de la temperatura
1211	Nivell d'ansietat		
0800	Termoregulació		

ROL COL·LABORADOR			
RISC DE COMPLICACIONS		NOC	
Respiratòries: Dispnea, hipoventilació, apnea.		0802	Signes vitals
		0408	Perfussió tissular pulmonar
Cardíacques / Disfunció vascular: Mareig, síncope, xoc..		2102	Nivell de dolor
		0415	Nivell estat respiratori
Neurològiques: Agitació psicomotriu		0401	Estat circulatori
Gastrointestinals: Nàusees, vòmits		0909	Estat neurològic
		2106	Nàusees i vòmits. Efectes nocius
NIC			
6680	Monitoratge dels signes vitals	2260	Maneig de la sedació
3350	Monitoratge respiratori	1450	Maneig de les nàusees
2620	Monitoratge neurològic	1570	Maneig del vòmit
3390	Ajuda a la ventilació	2380	Maneig de la medicació
3160	Aspiració vies aèries	2300	Administració de medicació
3320	Oxigenoteràpia	1400	Maneig del dolor
3120	Intubació i estabilització v. aèries		
4260	Prevenició del xoc		
4250	Maneig del xoc		
4190	Punció intravenosa		
2314	Administració medicació iv.		

13.6. Bibliografia

1. Giuseppe Mancia, Guia de práctica clínica de la ESH/ESC 2013 para el manejo de la hipertensión arterial. Rev Esp Cardiol. 2013;66:880.e1-e64 - Vol. 66 Núm.11 DOI: 10.1016/j.recesp.2013.07.016
2. NANDA. (2013). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014. Madrid: Elsevier.
3. Bulechek, GM. Et al. (2013). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Madrid: Elsevier
4. Moorhead, S. et al. (2013). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Madrid: Elsevier.
5. Johnson, M. et al. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos. 3a Edició. Barcelona: Elsevier