

Annex **g**

Classificació dels resultats infermers (NOC)

E. Castro.

Definicions

0118 Adaptació del Nounat

Resposta adaptativa a l'entorn extrauterí d'un nounat fisiològicament madur durant els primers 28 dies.

INDICADORS

011803 - Freqüència cardíaca

1. No pols
2. Bradicàrdia molt severa (<60 bpm)
3. Bradicàrdia severa (<80 bpm)
4. Bradicàrdia moderada (<100 bpm)
5. FC dintre dels paràmetres normals

1302 Afrontament de problemes

Accions personals per controlar els factors estressants que posen a prova els recursos del individu.

INDICADORS

130203 - Verbalitza sensació de controls

1. Molt greument descontrolat per la situació
2. Greument descontrolat per la situació.
3. Percepció moderadament tranquil·la.
4. Percepció força tranquil·la
5. Tranquil.

1401 Autocontrol de l'agressió.

Accions personals per abstenir-se de conductes violentes, combatives o destructives envers altres.

INDICADORS

140118 - Manté l'acord d'abstenir-se de conductes agressives

1. Intents continus d'agredir d'altres.
2. Intents recurrents d'agredir d'altres.
3. Intents moderats d'agredir d'altres.
4. Gairebé controla la conducta agressiva.
5. Conducta agressiva totalment controlada.

1404 Autocontrol de la por

Accions personals per eliminar o reduir els sentiments incapacitants, d'aprensió, tensió o inquietud secundaris a una font identificable.

INDICADORS

140417 - Controla la resposta de la por

1. Atac de pànic.
2. Conducta agitada.
3. Irritabilitat.
4. Verbalitza por, gairebé controlada.
5. Verbalitza absència de por. Tranquil.

1408 Autocontrol de l'impuls suïcida

Accions personals per contenir accions i intents de suïcidi.

INDICADORS

140813 - No intenta suïcidar-ser

1. Mai demostrat.
2. Rarament demostrat.
3. De vegades demostrat.
4. Freqüentment demostrat.
5. Sempre demostrat.

1620 Autocontrol de les convulsions

Accions personals per reduir o minimitzar l'aparició d'episodis de convulsions.

INDICADORS

Episodis de convulsions

1. "Status"
2. Tònic - clòniques.
3. Post crític inconscient
4. Post crític conscient.
5. Conscient i orientat.

1619 Autocontrol de la diabetis.

Accions personals per manejar la diabetis, el seu tractament, i per evitar complicacions.

INDICADORS

161912 - Tracta els símptomes de la hiperglicèmia.

1. Mai.
2. Rarament.
3. A vegades.
4. Sovint.
5. Sempre.

1403 Autocontrol del pensament distorsionat

Autorestricció de la alteració de la percepció, processos del pensament i pensament.

INDICADORS

140312 - Exposa pensaments basats en la realitat

1. Mai demostrat.
2. Rarament demostrat
3. A vegades demostrat.
4. Gairebé sempre demostrat.
5. Sempre demostrat.

1912 Caigudes.

Nombre de vegades que una persona cau.

INDICADORS

191205 - Caigudes durant el trasllat

1. > 10
2. 7-9
3. 4-6
4. 1-3
5. Cap

0902 Comunicació.

Recepció, interpretació i expressió dels missatges verbals, escrits i no verbals.

INDICADORS

090202 - Utilitza el llenguatge parlat

1. Greument compromès.
2. Substanciosament compromès.
3. Moderadament compromès.
4. Lleugerament compromès.
5. No compromès.

1820 Coneixements: control de la diabetis.

Grau de comprensió transmesa sobre la diabetis mellitus i la prevenció de complicacions.

INDICADORS

182006 - Descripció de l'hiperglicèmia i els símptomes relacionats

1. Cap descripció.
2. Escassa descripció.
3. Moderada descripció.
4. Descriu de manera substancial.
5. En fa una descripció extensa.

1813 Coneixement del règim terapèutic.

Grau de coneixement transmès sobre el règim terapèutic específic.

INDICADORS

181306 - Règim de medicació prescrita

1. Cap coneixement.
2. Escàs coneixement.
3. Coneixement moderat
4. Coneixement substancial.
5. Coneixement extens.

1817 Coneixements: part i deslliurament.

Grau de la comprensió transmesa sobre el part i la coronació vaginal.

INDICADORS

181711 - Tècniques d'empènyer efectives

1. Cap coneixement.
2. Coneixement escàs.
3. Coneixement moderat.
4. Coneixement gairebé apropiat.
5. Coneixement apropiat.

1406 Control de l'automutilació

Accions personals per reprimir les lesions autoinfligides intencionades no letals

INDICADORS

140606 - No s'autolesiona

1. Intents d'autolesions continus.
2. Intents d'autolesions recurrents.
3. Intents d'autolesions moderats.
4. Verbalitza control dels impulsos d'autolesions.
5. No s'autolesiona.

1902 Control de risc

Accions personals per prevenir, eliminar o reduir les amenaces per la salut modificables.

INDICADORS

190207 - Segueix estratègies de control de risc seleccionades

1. Mai (total exposat).
2. Frequent.
3. Moderat.
4. Lleu.
5. Sempre.

1106 Cura de les cremades

Grau de curació d'una cremada.

INDICADORS

110613 - Necrosi tissular

1. Molt intens.
2. Extens.
3. Moderat.
4. Petit.
5. No existeix.

0400 Efectivitat Bomba cardíaca

Adequació del volum de sang expulsat del ventricle esquerre per recolzar la pressió de perfusió sistèmica.

INDICADORS

40011 - Sorolls cardíacs anormals

1. Molt greus.
2. Greus.
3. Moderadament greus.
4. Lleugerament greus.
5. Cap.

0601 Equilibri hídric

Equilibri de l'aigua en els compartiments intracel·lulars i extracel·lulars de l'organisme

INDICADORS

060116 - Hidratació cutània

1. Signes de deshidratació molt greus.
2. Signes de deshidratació greus.
3. Signes de deshidratació moderadament greus.
4. Signes de deshidratació lleus.
5. Sense signes de deshidratació.

0401 Estat circulatori

Flux sanguini sense obstrucció, unidireccional a una pressió adequada mitjançant els grans vasos dels circuits sistemàtic i pulmonar.

INDICADORS

040104 - Tensió arterial (TA) mitja

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Hipotensió molt greu. | No detectable |
| 2. Hipotensió greu. | < a 49 mmHg |
| 3. Hipotensió alterada moderadament. | 50-75 mmHg |
| 4. Hipotensió alterada lleument. | 75-80 mmHg |
| 5. TA dins paràmetres normals. | |

040104 - Tensió arterial (TA) mitja

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Hipertensió (HTA) molt greu. | TAD > 140 |
| 2. Hipertensió (HTA) greu. | TAS > 220 i TAD > 121-140 |
| 3. Hipertensió (HTA) moderada. | TAS < 220 i TAD < 120 |
| 4. TA dins els paràmetres normals. | 90-140 mmHg |
| 5. Hipotensió. | < a 89 mmHg |

0112 Estat fetal: durant el part

Grau en el que els signes fetals estan dintre dels límits normals des del començament del part fins al naixement.

INDICADORS

11204 - Color del líquid amniòtic

1. Meconi en pasta
2. Intensament tenyit.
3. Tenyit.
4. Lleugerament tenyit.
5. Clar.

0909 Estat neurològic

Capacitat del sistema nerviós central i perifèric per rebre, processar i respondre als estímuls externs i interns.

INDICADORS

090901 - Consciència

1. Inconscient, no respon a cap estímul.
2. Respon a estímuls dolorosos.
3. Respon a estímuls verbals.
4. Conscient i desorientat i/o agitat.
5. Conscient i orientat.

0410 Estat respiratori: permeabilitat de les vies respiratòries

Vies traqueobronquials obertes, desallotjades i netes per l'intercanvi d'aire.

INDICADORS

041012 - Capacitat d'eliminar secrecions

1. Vies permeables.
2. Elimina secrecions amb ajuda.
3. Elimina secrecions alguna vegada espontàniament.
4. Elimina secrecions quan se li indica.
5. Elimina secrecions sense dificultat.

0415 Estat respiratori

Moviment de l'aire cap a dintre i fora dels pulmons i intercanvi alveolar de diòxid de carboni i oxigen.

INDICADORS

041501- Freqüència respiratòria

1. Apnea o alteració greu respiratòria.
2. Dificultat respiratòria greu.
3. Dificultat respiratòria moderada.
4. Dificultat respiratòria lleu.
5. Respiració lliure i efectiva.

1101 Integritat tissular: pell i membranes mucoses

Indemnitat estructural i funció fisiològica normal de la pell i les membranes mucoses.

INDICADORS

110113 - Integritat de la pell

1. Pell greument compromesa - necrosada
Esquinçament perineal (afecta mucosa rectal i esfínter).
2. Pell substancialment compromesa - lesionada.
Esquinçament perineal (afecta mucosa rectal).
3. Pell moderadament compromesa - petita erosió.
Esquinçament perineal moderat.
4. Pell lleument compromesa - envermellida.
Esquinçament perineal lleu.
5. Pell intacta.
Pell i mucoses íntegres.

2106 Nàusees i vòmits: efectes nocius

Gravetat dels efectes observats o comunicats de nàusees cròniques, basques i vòmits que perjudiquen el funcionament diari.

INDICADORS

210609- Malestar

1. Greu
2. Substanciosament.
3. Moderat
4. Lleuger.
5. Cap

1211 Nivell d'ansietat

Gravetat de l'aprensió, tensió o inquietud manifestada sorgida d'una font no identificable.

INDICADORS

121117- Ansietat verbalitzada

1. Atac de pànic.
2. Explosió ira / conducta problemàtica.
3. Inquietud, irritabilitat.
4. Intranquil·litat.
5. Tranquil·litat.

2300 Nivell de glucèmia

Magnitud a la que es mantenen els nivells de glucosa en plasma i en orina dintre del rang normal.

INDICADORS

230001- Concentració sanguínia de glucosa

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Molt greu | <20 |
| 2. Greu | 20-40 mg/ml |
| 3. Moderadament greu | 41-50 mg/ml |
| 4. Lleument alterada | 51-60 mg/ml |
| 5. Normal | >60 mg/dl |

1210 Nivell de por

Gravetat de l'aprensió, tensió o inquietud manifestada sorgida d'una font identificable.

INDICADORS

121031- Por verbalitzada

1. Por molt intensa.
2. Por intensa.
3. Por moderada.
4. Por lleu.
5. Absència de por.

2102 Nivell del dolor

Intensitat del dolor referit o manifestat.

INDICADORS

210201 - Dolor referit

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Dolor molt intens | 9-10 EVA |
| 2. Dolor intens | 7-8 EVA |
| 3. Dolor moderat | 5-6 EVA |
| 4. Dolor lleu | 3-4 EVA |
| 5. Absència de dolor | 1-2 EVA |

0416 Perfusió tissular cel·lular

Adequació del flux sanguini en la vascularització per mantenir la funció cel·lular.

INDICADORS

41604 - Saturació d'oxigen

1. Molt greu
2. Greu
3. Moderadament greu
4. Lleument alterada
5. Normal

0407 Perfusió tissular: perifèrica

Adequació del flux sanguini mitjançant els petits vasos de les extremitats per mantenir la funció tissular.

INDICADORS

040710 - Temperatura d'extremitats

1. Temperatura molt freda
2. Temperatura força freda
3. Temperatura moderadament freda
4. Temperatura lleugerament freda
5. Temperatura normal

1918 Prevenció de l'aspiració

Accions personals per prevenir el pas de les partícules líquides o sòlides als pulmons.

INDICADORS

191801 - Identifica factors de risc

1. Mai demostrat
2. Rarament demostrat
3. En algun moment demostrat
4. Frequentment demostrat
5. Sempre demostrat

0705 Resposta al·lèrgica localitzada

Gravetat de la resposta immune hipersensible localitzada a un antigen ambiental específic (exogen).

INDICADORS

70512 - Prujia localitzada

1. Greu
2. Força
3. Moderada
4. Lleu
5. Cap

0706 Resposta al·lèrgica: sistèmica

Gravetat de la resposta immune hipersensible sistemàtic a un antigen ambiental específic (exogen).

INDICADORS

70631 - Xoc anafilàctic

1. Hipotensió molt greu. No detectable
2. Hipotensió greu (<49 mmHg)
3. Hipotensió alterada moderadament (50-75 mmHg)
4. Hipotensió alterada lleument (70-89 mmHg)
5. TA dins dels paràmetres normals

1304 Resolució de l'aflicció

Accions personals per ajustar pensaments, sentiments i conductes a la pèrdua real o imminent.

INDICADORS

130403 - Verbalitza la realitat de la pèrdua

1. No verbalitza
2. Rarament ho verbalitza
3. En algun moment verbalitza
4. Verbalitza la pèrdua, però no l'acceptació
5. Verbalitza la pèrdua i la seva acceptació

1913 Severitat de la lesió física

Gravetat dels signes i símptomes de les lesions corporals

INDICADORS

191301 Abrasions cutànies

191307 Fractures extremitats

191308 Fractures pelvianes

191310 Fractures de columna

191311 Fractures cranials

191314 Traumatismes cranials oberts

191315 Traumatismes cranials tancats

1. Greu
2. Substancialment greu
3. Moderadament greu
4. Lleugerament greu
5. Cap

0413 Severitat de la pèrdua de sang

Gravetat del sagnat / hemorràgia interna o externa.

INDICADORS

041301 - Pèrdua de sang visible

1. Molt abundant (>40%)
2. Abundant (30-40%)
3. Moderada (15-30%)
4. Lleu (<15%)
5. Cap

2107 Severitat de les nàusees i els vòmits

Gravetat dels símptomes de nàusees, esforços per vomitar i vòmits.

INDICADORS

210302 - Freqüència dels vòmits

1. Més de 5 vòmits
2. Més de 2 vòmits
3. Nàusees i vòmit
4. Nàusees però sense vòmit
5. Sense nàusees ni vòmits

0417 Severitat del xoc anafilàctic

Gravetat dels signes i símptomes d'un flux sanguini inadequat per la perfusió dels teixits degut a la vasodilatació i la permeabilitat capil·lar amb una reacció sistèmica d'hipersensibilitat d'inici ràpid.

INDICADORS

041707- Estridor respiratori

1. Greu
2. Substancial
3. Moderat
4. Lleu
5. Cap

0802 Signes vitals

Grau en el que la temperatura, el pols, la respiració i la pressió sanguínia estan dintre del rang normal.

INDICADORS

080209 - Presència del pols

1. Sense pols
2. Pols central + /Humeral - /Radial -
3. Pols central + /Humeral + /Radial -
4. Pols central + /Humeral + /Radial + amb mala perfusió
5. Pols central + /Humeral + /Radial + amb bona perfusió

0800 Termoregulació

Equilibri entre la producció, el guany i la pèrdua de calor.

INDICADORS

080019 - Hipertèrmia

1. Temperatura > 41°
2. Temperatura > 40°
3. Temperatura > 39°
4. Temperatura > 37°
5. Temperatura 35-36°

080020 - Hipotèrmia

1. Hipotèrmia IV, molt greu 24°-13°
2. Hipotèrmia III, greu 26°-24°
3. Hipotèrmia II, moderada 26°-35°
4. Hipotèrmia I, lleu 35°-32°
5. Sense hipotèrmia