

DIFICULTAT RESPIRATÒRIA

VALORACIÓ VITAL

Pacient **Inconscient**: Seguir el procediment d'SVB.

Pacient **Conscient**: Valori els següents punts:

1. Comprovi permeabilitat de la via aèria.
2. Sospita de compromís respiratori: no fa frases senceres, freqüència respiratòria alta o molt baixa, cianosi, sorolls anormals en la respiració, irregularitat respiratòria.
3. Sospita compromís hemodinàmic (diaforesi, pal·lidesa, freqüència cardíaca < 60 bpm o > 100 bpm, polsos perifèrics i centrals (dèbils o difícil de reconèixer).
4. Valori el nivell de consciència.
 - A - Alerta: Estat de Vigília.
 - V - Somnolència: respon ordres verbals.
 - D - Estupor: respon a estímuls dolorosos.
 - I - Coma: NO RESPON a CAP estímulo (inconscient).

En cas de V,D,I, realitzi test de glicèmia capil·lar.

5. Confirmi si hi ha **opressió toràcica**.
6. Verifiqui si presenta o ha presentat mareig o pèrdua de coneixement.
7. Confirmi si hi ha antecedents d'anteriors malalties respiratòries o cardíagues.

CRITERIS D'ACTIVACIÓ d'Unitat de Suport Vital Avançat (USVA-USVI)

- Inconsciència (mantinguda o transitòria).
- Risc vital immediat:
 - No permeabilitat de la via aèria.
 - Compromís respiratori.
 - Compromís hemodinàmic.
- Si es confirmen els punts 5 i 6.

ACTUACIÓ

En espera d'una unitat de suport o amb transport per part de l'USVB (Unitat de suport vital bàsic) s'han de realitzar les següents accions:

- Garanteixi la permeabilitat de la via aèria i respiració efectiva.
- Administri O₂ (inicialment a: 3L/min a una FiO₂ = 24%) si hi ha compromís respiratori.

Augmenti flux i concentració fins:

- a) Sat O₂ > 95%
 - b) Sat O₂ > 90% MPOC
- Col·loqui el pacient en posició de sedestació o 60°-90° respecte la llitera, un cop desobstruïda la via aèria.
 - Re-avaluar contínuament els signes vitals (A.B.C.D).
 - Si disposa d'aparell automàtic de mesura de la tensió arterial procedeixi a fer una mesura.

RESOLUCIÓ

- Transporti a velocitat constant.
- Fixi el pacient amb corretges per garantir la immobilització.
- Mantingui l'assistència durant el trasllat avaluant les constants vitals.

OBSERVACIONS	
Paràmetres normals de les constants vitals	
Pressió Arterial:	Sistòlica 100 - 160 mm de Hg.
	Diastòlica 60 - 100 mm de Hg.
Freqüència Cardíaca:	60 - 100 bpm (batecs per minut).
Freqüència Respiratòria:	10 - 24 rpm (respiracions per minut).
Temperatura axil·lar:	35,5 - 37,5°C.
Glucèmia normal (pacient no diabètic):	> 60 i < 120 mg/dL.
Sat. parcial d'oxigen (pulsioximetria)	> 95%