

Amiodarona

Nom Comercial:	Trangorex©
Indicacions:	TV / FV. Fibril·lació i flutter auricular.
Presentació:	Ampolles de 150 mg / 3 ml
Dosi \ \ via:	<u>TV/FV sense pols</u> : Bolus 300 mg (2 ampolles en total 6 ml +14 ml de SG al 5% després de la 3a DF) Ritmes DF refractaris: 150 mg (1 Amp +17 ml de SG 5%) <u>Taquiarítmies</u> : 300 mg (2 ampolles) +50 ml de SG 5 % iv a passar en 30 min. Dosi de manteniment: 10 a 20 mg/kg/24 h (900-1200 mg / 24 h)
Per 70 Kg:	300 mg
Efectes Secundaris:	Pot empitjorar les arítmies (Torsades de pointes, bradicàrdia, bloqueig, hipotensió arterial, ICC , hipotiroidisme, toxicitat hepàtica severa, nàusees, flebitis, insuficiència respiratòria greu.
Contraindicacions:	Hipersensibilitat al iode Disfunció severa del nodus sinusal Bradicàrdia sinusal Bloqueig AV de 2º o 3º grau Xoc cardiogènic Trastorns de la funció tiroïdal
Observacions:	No utilitzar amb altres fàrmacs que perllonguen l'interval QT (p.e. procaïnàmid)
El trobaràs a la guia:	Aturada cardiorespiratòria (ACR).