

## **Dexclorfeniramina**

Nom Comercial:	<u>Dexclorfeniramina Maleato Combino Pharm©:</u> <u>Polaramine©</u>
Indicacions:	Antihistamínic: competidor histamina. <b>Disminució símptomes al·lèrgics.</b>
Presentació:	5 mg / 1 ml.
Dosi \ via:	5-20 mg \ im-iv màxim 20 mg/24h. <u>Pediatria:</u> 0,1-0,15 mg / kg / 6 - 8 h \ iv o im. profunda (0,2 ml / 10 kg / 6-8 h). màxim diari 20 mg.
Per 70 Kg:	5 mg \ im.
Dilució:	En iv diluït en 5 ml SF i administrar entre 2 i 5 min.
Efectes secundaris:	Somnolència, efectes anticolinèrgics (sequedat de boca, visió borrosa, trastorns gastrointestinals).
Contraindicacions:	Nounats, hipersensibilitat, tractament amb IMAO.
Observacions:	Es potencia l'efecte somnolent amb opiacis, alcohol i depressors SNC.  En nens ús a partir dels 30 mesos, abans contraindicat en nounats i sense referències en menors de 2 anys.  Modifica l'efecte anticoagulants orals.
El trobaràs a la guia:	<b>Malalt amb reacció al·lèrgica.</b>