

Etomidat

Nom Comercial:	<u>Etomidato-Lipuro© Hypnomidate©</u>
Indicacions:	Sedant.
Presentació:	20 mg/10 ml (2 mg/ml).
Dosi \ \ via:	0,025 a 0.3 mg /kg \ \ iv. en 30 segons. Sedació conscient: 0,025 - 0,1 mg/ kg \ \ iv. Sedació superficial: 0,1 - 0,2 mg/kg \ \ iv. Sedació profunda: 0.2 - 0,3 mg/kg \ \ iv.
	<u>Pediatría:</u> Mateixa dosi que en adults.
Per 70 Kg:	Sedació Conscient: 7 mg (3,5ml). Sedació superficial: 14 mg (7ml). Sedació profunda: 1 amp (10ml).
Efectes secundaris:	Nàusees i vòmits. Hipotensió, depressió miocàrdica (però menys que els altres hipnòtics). Depressió respiratòria, apnea. Moviments musculars mioclònics (es poden tractar amb benzodiazepines).
Contraindicacions:	Porfíria. Epilèpsia. Malaltia d'Addison.
Observacions:	No altera l'estat hemodinàmic. No té efectes analgèsics. El Verapamil potencia l'efecte i la toxicitat de l'Etomidat. Evitar perfusió contínua: pot causar insuficiència suprarenal.
El trobaràs a la guia:	Malalt traumàtic. Annex d: Seqüència d'intubació traqueal ràpida.