

## Hidrocortisona

Nom Comercial:	<u>Hidrocortisona Color©; Actocortina©</u>
Indicacions:	<b>Asma. MPOC.</b> Reaccions d'hipersensibilitat agudes i xoc anafilàctic.
Presentació:	100 mg en pols per reconstituir amb 2 ml.
Dosi \ \ via:	100 a 500 mg diluïts en 50-100 ml de sèrum salí 0,9% en 10 min \ \ iv. <u>Pediatria:</u> 1-4 mg/kg
Per 70 kg:	100-200 mg. Es pot repetir dosi c/ 30 min.
Efectes secundaris:	HTA, insuficiència cardíaca, edemes, eufòria, psicosis, hipopotassèmia, hiperglucèmia, debilitat muscular, glaucoma i increment de la susceptibilitat a infeccions sistèmiques.
Contraindicacions:	Hi ha múltiples contraindicacions, que són relatives en casos d'urgència vital.
Observacions:	L'administració iv ràpida pot produir cremor i formigueig a les zones genitals i perineal. Inici d'acció en minuts, pic màx. als 60 min. Efecte disminuït per: rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoïna, efedrina, aminoglutetimida. Antagonitza efecte de: hipoglucemians, antihipertensius, diürètics. Augmenta l'efecte de: acetazolamida, diürètics de nansa, carbenoxolona, anticoagulants cumarínics, relaxants musculars no despolaritzats (mioflex©) Augmenta risc d'úlceres gastrointestinals amb AINE. Disminueix nivells sèrics de salicilats; Potencia arítmia associada a hiperkalièmia amb digital.
El trobaràs a la guia:	<b>Malalt amb dispnea.</b>