

Manitol

| | |
|------------------------|--|
| Nom Comercial: | <u>Osmofundina concentrada©; Manitol©</u> |
| Indicacions: | Hipertensió intracranial (diürètic osmòtic). |
| Presentació: | Ampolla 20 g / 250 ml (80 mg/ml). |
| Dosi \ \ via: | 0,25-1 g/Kg. |
| Per 70 kg: | 200 ml en 20 min. |
| Efectes secundaris: | ICC i EAP per sobrecàrrega de volum. Hipertensió / hipotensió. Taquicàrdia i dolor anginos. Cefalea i somnolència. Convulsions. Alteracions electrolítiques (hiper-hiponatrèmia, hiper-hipopotassèmia), acidosi metabòlica. |
| Contraindicacions: | Insuficiència cardíaca congestiva. Edema agut de pulmó. Hemorràgia intracranial activa. Insuficiència renal en fase d'anúria. Deshidratació severa. Hipovolèmia important. Hipotensió arterial severa. |
| Observacions: | Cristal·litz a baixes temperatures pel que pot ser necessari reescalfar agitant suaument fins a la seva total dissolució. La seva extravasació pot produir edema local i necrosi de la pell. |
| El trobaràs a la guia: | Malalt traumàtic. |