

Midazolam

- Nom Comercial: Midazolam B. Braun©; Dormicum ©
- Indicacions: **Sedació i anticomicial.**
- Presentació: 15 mg / 3ml (5 mg/ml).
- Dosi \ \ via: 0,1 - 0,4 mg/kg. \ \ iv-in.
Sedació en agitació: 5 mg \ \ iv repetir s/p dosi màx 30 mg / 24h.
Sedació profunda (IOT): 0,1 a 0,3 mg/kg \ \ iv. Dosi de manteniment 0,2-0,4 mg/kg \ \ iv.
Sedació conscient: 0,025-0,1 mg/kg \ \ iv.
Convulsions: 0,1 mg/kg \ \ iv o 0,2-0,4 mg/kg \ \ in
Pediatría: Sedació en IOT 0,1 mg/kg.
Hipnòtic 0,2-0,3 mg/kg \ \ iv (si inestabilitat hemodinàmica reduir dosi a la meitat).
- Per 70 kg: 7 - 15 mg
- Efectes secundaris: Depressió respiratòria, taquicàrdia, hipoTA, arítmies, cefalea, tos, reaccions vagals.
- Contraindicacions: Hipersensibilitat.
- Observacions: Protegir de la llum. Conservar entre 15 i 30°. Potencia efectes depressors SNC. Antídot Flumazenil.
- El trobaràs a la guia: **Alteracions del SNC: malalt amb convulsions.**
Malalt traumàtic.
Annex d: Seqüència d'intubació traqueal ràpida