

Nitroglicerina

| | |
|------------------------|--|
| Nom Comercial: | Solinitrina ©, Vernies©, Cafinitrina© |
| Indicacions: | Vasodilatador , redueix el consum de oxígen del miocardi. |
| Presentació: | Comprimit 0,4 mg. Ampolla de 5 mg/5 ml (1 mg/ml). |
| Dosi \\\ via: | Comprimits 0,4 mg \\\ sl. BPC: Dil. 1 ampolla de 5 mg/ 5 ml + 45 ml de SG 5% \\\ iv. |
| Per 70 kg: | 0,4 mg \\\ sl. BPC: Iniciar a velocitat infusió 3-5 ml/h. |
| Efectes secundaris: | Taquicàrdia, hipoTA, nàusees, vòmits, cefalea, rubor, diaforesi, bradicàrdia paradoxal. |
| Dilució: | 10 mg en 50 de sol. SG 5%. |
| Contraindicacions: | Hemorràgia cerebral, hipovolèmia, anèmia greu, hipoTA, IAM dret, tamponament cardíac, pericarditis constrictiva, glaucoma. |
| Observacions: | Pot provocar dolor local i flebitis. Preservar de la llum. NOMÉS administrar si TAS>90 mmHg i FC entre 50 i 100 bpm |
| El trobaràs a la guia: | Malalt amb dolor toràcic. Malalt amb alteracions de la tensió arterial. |