

# RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ PEL MANEIG DEL **MALALT AMB INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA HIPOXÈMICA** en el context de la infecció pel **Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)** 2020


## OXIGENOTERÀPIA



**NO** utilitzar mascaretes tipus Venturi®

**Ulleres nasals** (màxim 4 litres)  
o bé

Mascaretes d'alta concentració tipus **Monhagan®**



*Considerar posar mascareta quirúrgica a sobre, durant oxigenació*

## NEBULITZACIONS

**NO estan recomanades si no es poden realitzar en entorns apropiats.**

Si cal tractament broncodilatador, usar la càmera inhalatòria del malalt amb els seus propis inhaladors.

Evitar la nebulització. Reforç amb tractament endovenós.

## VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA (VMNI)

**No es considera indicada en l'àmbit prehospitalari.** Prioritzar la VMI amb **filtre al tub endotraqueal**.

Principals motius per contraindicar la VMNI:

1. S'ha observat que el fracàs de la VMNI és molt alt i pot augmentar la mortalitat si s'endarrerix la VMI.
2. Genera dispersió a l'ambient dels virus amb el risc que això suposa per l'equip.

## VENTILACIÓ MECÀNICA INVASIVA (VMI)

Si ventilació inadequada i mala oxigenació, **plantejar IOT+Ventilació mecànica**. Revisar recomanacions de la infografia '[Maneig avançat de la via aèria](#)'.

Pendent dels criteris del Departament de Salut. Caldrà **valorar la decisió d'intubació en funció de les patologies de base, l'edat i l'estat del pacient.**

**SI CAL 3.51 (USVA),  
OPTIMITZAR  
RECURSOS**

alliberar  
**3.19**

**TRASLLAT AMB  
EL CAPÇAL DE  
LA LLITERA  
INCORPORAT 45°**

